



Cavaglio d'Agogna Suno
 Mezzomerico Barengo
 Romagnano Sesia
 Marano Ticino
 Sizzano Boca
 Bogogno
 Ghemme
 Briona
 Cressa
 Fara

Servizio tecnico Colline novaresi

MESSAGGIO NR 8 DEL 27/05/14

SITUAZIONE

Il nebbiolo nei siti medi è in piena fioritura, iniziata come da previsioni il 20-21 maggio. Permane un anticipo di circa 10 giorni sulla media.

Sono in fioritura più o meno avanzata anche merlot/vespolina barbera chardonnay erbaluce mentre devono ancora partire uva rara e croatina (zone medie)

PERONOSPORA

Attualmente la pressione della malattia è pressoché nulla ma resta prioritaria la considerazione della massima sensibilità al patogeno di questa fase fenologica e le previsioni di tempo instabile (con acquazzoni giornalieri) per altri 10 giorni almeno si consiglia pertanto di eseguire il quinto trattamento, tra

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 28-29 MAGGIO

O max 13 giorni dal precedente trattamento

Le due giornate probabilmente più asciutte che precedono una ripresa temporalesca di venerdì.

Riutilizzando uno dei seguenti prodotti:

- *FLUOPICOLIDE+FOSETYL-AL (r6 albis)
- *AMETOCTRADINA+**FOSFONATO DI POTASSIO(enervin pro)
- ***FAMOXADONE+FOSETYL-AL (alial sistem)
- ***FENAMIDONE+FOSETYL-AL(elicio-veritas)

Oppure

- *FENILAMMIDI (METALAXIL-M/BENALAXYL- M+ * MANCOZEB

Alcuni esempi di prodotti che le contengono(ridomil gold mz pepite/mexil oro mz wg/qubic mz/mevalaxil m/fantic m

OIDIO

estrema sensibilità attuale anche verso questo patogeno. Aggiungere un antiodico, a scelta tra quelli appartenenti

al gruppo degli \$ IBE:MICLOBUTANIL/DIFENO-FENBU-PEN-PROPI-TEBU-TETRA- CONAZOLO

esempi di prodotti che li contengono(duokar pro/tiochur forte/mosaico/galeo/score 25/sponsor/boneco/indar 5ew/simitr e ew/topas 10 ec/support 10 ec/protil ec/tebusip 46, ares 5 sc, domark 125, lidal e molti altri eventualmente associati ad altri sostanze attive, nelle situazioni più critiche

IBE+ \$ QUNOXYFEN(arius system)

IBE+ \$ BUPIMIRATE(vineto)

IBE+ \$\$ CYFLUFENAMID (dynali)

Indicato ora anche

***TRIFLOXYSTROBIN (flint) per il suo effetto collaterale antibotritico viste le condizioni umide in fioritura

Si ricorda l'utilità -a inizio allegazione- in particolare su Nebbiolo DELLA DISTRIBUZIONE DI ZOLFO IN POLVERE

LIMITAZIONI D'USO STRETTAMENTE CONSIGLIATE E A TUTTI I VITICOLTORI

- *MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO (OGNUNA) PER FLUOPICOLIDE/AMETOCTRADINA / MANCOZEB
- *MAX 3 TRAT./ANNO PER LE SA DEL GRUPPO FENILAMMIDI (ES. 3 METALAXIL ESCLUDONO USO BENALAXIL)
- **MAX 5 TRATTAMENTI ANNO CON FOSFONATO DI POTASSIO
- *** MAX 3 TRATTAMENTI IN TOTALE TRA LE SEGUENTI SA APPARTENENTI AL GRUPPO DEI QOI:
FAMOXATE/FENAMIDONE/ e antiodici TRIFLOXYSTROBIN/AZOXYSTROBIN/PIRACLOSTROBIN
MANCOZEB/METIRAM/DITIANON/ PROPINEB SI POSSONO USARE SOLTANTO FINO ALL'ALLEGAGIONE.

SANTIODICI DEL GRUPPO IBE: MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO. TRA QUESTI NON SONO AMMESSI prodotti classificati come Corrosivi, T, T+, e formulati Xn con frase di rischio R40, R60, R61, R62, R63, R68.

\$ QUNOXYFEN E BUPIMIRATE: OGNUNO MAX 3 TRAT./ANNO

\$\$ CYFLUFENAMID MAX 2 TRATT./ANNO